



# *CONNaissez VOUS LES POISSONS*





# *LE BROCHET*




Le brochet préfère les eaux claires à fond graveleux et aux berges riches en végétation.


Le corps est allongés, le dos brun-vert, les flancs plus clairs possèdent des bandes transversales.

Les deux mâchoires possèdent jusqu'à 700 dents.

Il peut atteindre une taille de 150 cm.




# LE SANDRE



Le sandre fréquente les cours d'eau, ainsi que les eaux calmes, lacs, étangs, réservoirs.

Le corps est élancé et la tête allongée, la bouche est largement fendue et présente une dentition fortement développée. Sa couleur est gris verdâtre.

Il peut atteindre une taille de 120 cm et peser 15 Kg.




# *LA PERCHE COMMUNE*



La perche se rencontre dans toutes les eaux libres et stagnantes à une altitude inférieure à 1000 m.


Le corps est haut, le dos gris vert, les flancs portent 6 à 9 bandes transversales sombres.

Elle peut atteindre un poids de 4,8 Kg.




Sa reproduction a lieu dans la mer des Sargasses. La ponte intervient entre 400 et 700 mètres dans des eaux de 16 à 17 °C. Ses larves dérivent 2 ans dans l'atlantique, elles se métamorphosent alors en civelles.

Elle peut atteindre une taille de 150 cm et peser 4 Kg.




# *LE SILURE*




Le silure est le plus grand des carnassiers d'eau douce de France.

Il peut dépasser une taille de 5 m et peser jusqu'à 300 kg, (2,20 m actuellement en France).




# *LA PERCHE SOLEIL*



La perche soleil est un poisson d'eau calme en rivière ou en étang.  
Elle dépasse rarement une taille de 20 cm.

*C'est un poisson classé espèces nuisibles en France.*



# *LE BLACK BASS*




Il fréquente les milieux aquatiques de plaine, riche en végétation.


Le black-bass a une forme allongée et trapue.

La nageoire dorsale est presque complètement séparée en deux parties distinctes.

Il peut atteindre une taille de 30 à 80 cm.



# *LE POISSON CHAT*




Le poisson chat est une espèce d'eau calme.

Le corps est moyennement allongé, la peau est nue. La tête est large et aplatie, la bouche est grande et entourée de 8 barbillons.

Il peut atteindre une taille de 30 à 40 cm et peser 1,5 Kg.

**C'est un poisson classé espèces nuisibles en France.**




# *LE CHEVESNE*



Le chevesne fréquente les eaux courantes, il est rare dans les lacs.

Le corps est fuselé, de section presque ronde, le front est large et plat, le dos brun vert.

Il peut atteindre une taille de 80 cm et un poids de 4,5 Kg.




# LA TRUITE FARIO



La truite fario est un poisson d'eau froide : elle affectionne les eaux entre 7 et 15°C, On retrouve la truite fario dans des eaux vives et bien oxygénée.

Elle est sensible aux perturbations physiques et chimiques des rivières, ce qui fait de sa présence, de son absence une indication de l'état du milieu




# L'ABLETTE




Le corps est fin et comprimé latéralement, le dos est gris bleu. Les flancs et le ventre sont argentés, les nageoires gris pâles. La bouche est oblique et orientée vers le haut.

L'ablette vit en bancs dans les eaux claires lentes et stagnantes.

Elle peut atteindre une taille de 12 à 15 cm et un poids de 20 à 50 g jusqu'à 200 g.




# *LE GARDON*



Le corps est aplati latéralement, le dos plus ou moins haut est vert-bleu, les flancs argentés, les écailles sont grandes et les yeux sont rouges.

Le gardon est répandu dans les eaux stagnantes et lentes.

Il atteint une taille de 15 à 45 cm et un poids allant jusqu'à 2,4 Kg.




# *LE ROTENGLÉ*



Le corps est comprimé latéralement, le dos est bombé et brun-vert. Les flancs sont cuivrés et le ventre est argentés, les nageoires sont rouges. La bouche est étroite et oblique.

Le rotengle vit dans les eaux calmes à fond boueux.

Il peut atteindre une taille de 15 à 45 cm et un poids de 300 g jusqu'à 1,800 Kg.




# LA BOUVIÈRE




La bouvière est un minuscule poisson coloré de nos eaux douces. C'est une espèce protégée qui possède une relation symbiotique étroite avec la moule d'eau douce.

La bouvière possède des flancs argentés, tirant sur le rose, parcourus par une ligne bleutée.

Le mâle va accompagner la femelle de moule en moule, dans les branchies desquelles celle-ci va déposer, grâce à son tube de ponte, une quarantaine d'œufs qui seront ensuite fécondés par la laitance du mâle.



# L'ÉPINOCHÉ




*Épinoche*

L'épinoche à trois épines est un minuscule poisson possédant un corps fuselé, comprimé latéralement.

Sa tête est assez petite, avec des yeux assez gros, et se termine par une bouche étroite orientée légèrement vers l'avant et le haut.

La nageoire dorsale de l'épinoche est précédées de trois épines, deux longues et une courte disposées sur le dos du poisson.

La coloration de ce poisson est brun verdâtre pour le dos, avec des reflets métalliques, argenté pour les flancs et blanchâtre pour le ventre.




# LA BRÈME



Le corps est élevé et comprimé latéralement, la bouche est petite et dépourvue de barbillon. Le dos est vert bronzé, les flancs clairs, les nageoires sont grises. claires lentes et stagnantes.

La brème vie dans les eaux calmes des cours d'eau et des étangs de plaine.

Elle peut atteindre une taille de 70 cm et un poids pouvant aller jusqu'à 6 Kg.




# *LE CARASSIN DORÉ*



Les populations retournées à l'état sauvage perdent en quelques générations leur couleur caractéristiques. Le dos est brun clair, les flancs et le ventre jaunes.

Le carassin, ou poisson rouge préfère les eaux lentes ou stagnantes à fond meuble et végétation dense.




# *LA CARPE COMMUNE*



Le corps est allongé et plus ou moins haut.

La carpe vie dans les eaux lentes à fond sablo-vaseux, riche en végétation.

Elle peut atteindre une taille de plus de 1m pour un poids de 30 Kg.




# *LA CARPE MIROIR*



Les carpes miroirs ont une écaillure incomplète.

La reproduction a lieu de juin à juillet dans la végétation des eaux peu profondes, les œufs (100 000 par Kg de femelle) incubent pendant 3 à 8 jours.




# LA CARPE CUIR




La carpe cuir est dépourvue d'écaille, ou en a très très peu. Les carpes sont surtout actives au crépuscule.

La bouche protractile est munie de 4 barbillons, 2 longs et 2 courts.




# L'ESTURGEON




Le corps allongé, est recouvert de 5 rangées longitudinales de plaques osseuses. Le dos est gris-brun avec des reflets verts, le ventre est jaunâtre avec des reflets argentés, le museau est pointu.

Il peut atteindre une taille allant jusqu'à 3,5 m pour un poids de 170 Kg.




# LE GOUJON




Le corps est allongé, le dos est vert-bleu, les flancs sont plus clairs avec une rangée longitudinale de tâches bleues et violettes. La mâchoire supérieure porte 2 courts barbillons.

Le corps est allongé, le dos est vert-bleu, les flancs sont plus clairs avec une rangée longitudinale de tâches bleues et violettes. La mâchoire supérieure porte 2 courts barbillons.

Il peut atteindre une taille de plus 20 cm pour un poids de 175 g.




# LE VAIRON




Le vairon fréquente les cours d'eau et les lacs oxygénés à fonds graveleux.

Le corps est allongé, le dos est gris vert avec des raies transversales foncées, les flancs sont argentés, le ventre blanc.

Il mesure de 7 à 14 cm.




# LE CHABOT



Petit poisson brun plus ou moins sombre avec des marbrures plus foncées d'une dizaine de centimètres.

Il est dépourvu de vessie natatoire (sac d'air) et vit donc exclusivement sur les fonds des parties amont des cours d'eau, voir dans des lacs bien oxygénés.

Prédateur nocturne, il se nourrit principalement de larves d'insectes aquatiques.




# LA LOCHE



La loche de rivière affectionne les milieux à fonds sableux et à courant lent comme certaines rivières de plaine, plans d'eau ou sablières.

La loche de rivière se nourrit durant la nuit et prélève vers, invertébrés et particules organiques qui sont filtrés et séparés des particules minérales à travers l'appareil branchial.

La loche de rivière est une espèce réputée sensible à la pollution chimique et sa présence témoignerait d'une bonne qualité des sédiments dans son milieu.




# LA GRÉMILLE




La grémille a un dos bombé, un front large et un museau mousse. Le dos et les flancs sont vert-gris parsemés de tâches noires.

La grémille vit généralement en bancs dans les eaux profondes des grands cours d'eau.

Elle atteint une taille de 30 cm.




# LA TANCHE



Le corps est trapu, le dos vert-brun, les flancs plus clairs ont des reflets cuivrés, le ventre est blanc-jaune. Un petit barbillon est disposé de chaque côté de la bouche.

La tanche fréquente les cours d'eau lents et les étangs peu profonds à végétation abondante.

Elle peut atteindre un poids de 4 kg.




# LE BARBOT



Le barbeau possède un corps cylindrique et plutôt allongé. Son dos est légèrement bombé et d'un ton brun-vert. Ses flancs sont d'un beau doré alors que le ventre est blanc.

Les nageoires caudale, anale et les pelviennes sont orangées. La tête du barbeau est longue, la bouche infère (placée sous la tête) est bordée d'épaisses lèvres charnues et portent 4 barbillons sur la lèvre supérieure pour lui permettent de fouiller les fonds.




# L'ÉCREVISSE AMÉRICAINE



L'écrevisse américaine se nourrit de toutes sortes de débris organiques et végétaux. Elle consomme volontiers vers et autres invertébrés vivants ou morts.

Elle est assez agressive envers les petits poissons (vairons, épinoches, etc.) qu'elle peut dévorer.

**Cette espèce est classée nuisibles en France.**



# L'ÉCREVISSE DE LOUISIANE



Le barbeau possède un corps cylindrique et plutôt allongé. Son dos est légèrement bombé et d'un ton brun-vert. Ses flancs sont d'un beau doré alors que le ventre est blanc.

Les nageoires caudale, anale et les pelviennes sont orangées. La tête du barbeau est longue, la bouche infère (placée sous la tête) est bordée d'épaisses lèvres charnues et portent 4 barbillons sur la lèvre supérieure pour lui permettent de fouiller les fonds.

**Cette espèce est classée nuisibles en France.**